

HANSENÍASE MULTIBACILAR NA INFÂNCIA.RELATO DE CASO DE APRESENTAÇÃO MUITO PRECOCE

AUTORES

GIRÃO R.J.S.;MACHADO H.A.S; LIMA L.A.N; LIMA L.E; CARVALHO,T.C.B

INSTITUIÇÃO

Faculdade Integral Diferencial-FACID, Universidade Federal do Piauí-UFPI, Hospital São Marcos
Teresina – PI.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, endêmica no Brasil, causada pelo bacilo *Mycobacterium leprae*. A maioria dos casos detectados na infância são paucibacilares, de 70 a 94%, sendo raros os casos multibacilares em menores de 3 anos. **Motivo de Comunicação:** paciente de 1 ano e 10 meses com quadro de Hanseníase multibacilar, com baciloscopia positiva, um caso raro, de apresentação muito precoce. Devendo-se considerar, este diagnóstico em crianças menores de 3 anos, principalmente em áreas endêmicas. **DESCRIÇÃO:** Paciente de 1 ano e 10 meses, masculino, procedente de Teresina-Piauí, com placas eritemato infiltradas em membros superiores e dorso. Contactante de hanseniano multibacilar. Foi realizado baciloscopia das lesões, cotovelos e pavilhão auricular, com presença de bacilos íntegros e fragmentados, com índice bacilar 1. A histopatologia evidenciou dermatite crônica granulomatosa, compatível com hanseníase dimorfa. Foi iniciado PQT multibacilar com boa evolução, com regressão das lesões cutâneas e o paciente recebendo alta 12 meses após. **CONCLUSÃO:** A hanseníase na infância é rara, especialmente em menores de 5 anos, em virtude do período de incubação da doença ser longo, em média 5 a 7 anos. Entretanto, em países endêmicos, onde a população infantil entra precocemente em contato com doentes bacilíferos, é possível observar hanseníase em crianças de 3 a 5 anos, mas absolutamente excepcional em menores de 2 anos, principalmente multibacilares.