

SITUAÇÃO ATUAL DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO

AUTORES

BATISTA, DA; BORGES, JS; DIAS, DN; DIAS, VN; OLIVEIRA, PG; RIBEIRO, TN.

RESUMO

Introdução: A tuberculose está intimamente ligada ao aumento da pobreza e à urbanização, predominando nos indivíduos economicamente ativos. O Ministério da Saúde (MS) do Brasil estima uma prevalência de 42,7/100.000/habitantes. Na esfera do indivíduo são fatores associados à tuberculose: infecção pelo HIV, alcoolismo crônico, diabetes mellitus, entre outras enfermidades. **Objetivo:** Traçar o perfil epidemiológico da Tuberculose em pacientes notificados pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica da cidade de Caxias (MA), no ano de 2007 e 2008. **Metodologia:** Análise quantitativa e descritiva dos dados de 117 fichas de notificação da doença. **Resultados:** Distribuição por sexo: homens (59,8%) e mulheres (40,2%); Faixa etária: 5 a 19 (5,1%), 20 a 34 (34,2%), 35 a 49 (25,6%), 50 a 64 (23,1%) e 65 a 79 (12%); Zona de residência: urbana (88,9%) e rural (8,5%); Escolaridade: analfabeto (35,9%), ensino fundamental incompleto (37,6%), ensino médio incompleto (10,3%), ensino médio completo (13,7%) e ensino superior (1,7%). **Agravos associados:** AIDS (18,4%), alcoolismo (72,6%), diabetes (23,6%) e outros (23,7%). **Prevalência da tuberculose:** 40,5/100.000/habitantes (2007) e 41,2/100.000/habitantes (2008). **Conclusões:** A doença prevaleceu no sexo masculino, adultos jovens, analfabetos e pessoas com pouco ensino e em residentes da zona urbana, atingindo principalmente a classe trabalhadora. A baixa escolaridade reflete as condições socioeconômicas precárias, que aumentam a vulnerabilidade à tuberculose. Dentre os agravos associados o alcoolismo foi responsável pela maioria, seguido do diabetes. A tuberculose em Caxias acompanhou a prevalência nacional, sendo um grave problema de saúde pública.