

CORIORRETINOPATIA SEROSA CENTRAL: RELATO DE UM CASO

AUTORES

DUTRA, P.H.C.; MARTINS FILHO, L.F.S.; CUNHA, A.C.R.; SOARES, S.C.A.; PAULO, L.S.; VILMAR, B.C.M.; NOGUEIRA, D.M.

INSTITUIÇÃO

Faculdade NOVAFAPI, Teresina-PI

RESUMO

INTRODUÇÃO: A coriorretinopatia serosa central (CSC) é uma doença caracterizada por um descolamento seroso da retina neurosensorial na mácula, secundário a uma ou mais lesões focais do epitélio pigmentário da retina (EPR). A CSC ocorre mais freqüentemente em adultos jovens, em indivíduos do sexo masculino e, geralmente, unilateral. **DESCRIÇÃO DO CASO:** Paciente masculino, 32 anos, atendido em consultório médico com queixa de baixa acuidade visual do olho esquerdo (OE) havia 2 semanas. Relatava episódio depressivo recente e negava uso de medicamentos e outras comorbidades. Ao exame oftalmológico: acuidade visual em olho direito (AVOD): 1,0 ; acuidade visual em olho esquerdo (AVOE): 0,3. Pressão intra-ocular (PIO): 12mmHg AO. Biomicroscopia de segmento anterior sem alterações em ambos olhos (AO). Fundoscopia: sem alterações no olho direito (OD). No OE, nota-se elevação fina e translúcida da mácula (figura 1). A angiografia fluoresceínica (AFG) revelou EPR com vazamento de contraste sub-retiniano por dois pontos. Foi optado por conduta expectante. O caso em discussão diz respeito a um indivíduo do sexo masculino e adulto jovem, com suposto episódio depressivo recente (fator de estresse?), associados à baixa acuidade visual unilateral. Tais informações se encaixam no perfil epidemiológico típico do paciente com CSC. A clínica e exames complementares também são característicos de tal patologia, o que reforça a hipótese diagnóstica. **CONCLUSÃO:** A anigiofluoresceinografia (AFG) evidenciou vazamento subretiniano do contraste, o que é compatível com a fisiopatologia da CSC (pontos de ruptura do EPR, com extravasamento de líquido para o espaço sub-retiniano e conseqüente descolamento seroso da retina).